

Δραστική ουσία	Εμπορικά φάρμακα	μέγιστος αριθ. ανά έτος/ μεσοδιάστημα	Ημέρες πριν τη συγκομιδή	Σκεύασμα/100 λίτρα ψεκ.υγρού	BIO	Στάδιο εφαρμογής	Παρατηρήσεις
Ψεκασμοί Κάλυψης φυλλώματος							
acetamiprid	Carnadine 20 SL	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 80 ml	–	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	διασυστηματικό
lambda-cyhalothrin 5%	Kaiso Sorbie 5 EG	2 / 14 ημ.	14 ημέρες	Καρπόβια 20 γρ	–		επαφης
lambda-cyhalothrin 10%	Karate 10 CS	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 10 ml	–	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	επαφης
	Forza zeon 10 CS						
	Lambda zeon 10 CS						
	Mateus zeon 10 CS						
	Premius zeon 10 CS						
	Selanox zeon 10 CS						
lambda-cyhalothrin 2,5%	Volur zeon 10 CS						
	Lambda 2,5 WG	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 40 γρ	–	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	επαφης
	Lamdex 2,5 WG						
	Premius 2,5 WG						
	Saratan 2,5 WG						
lambda-cyhalothrin 1,5%	Selanox 2,5 WG						
	Karate zeon 1,5 CS	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 70 ml	-	μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφης
cyantraniliprole	Exirel bait	2/ 3 έτη	14 ημέρες	20-35	-	ψεκασμοί κάλυψης στα αρχικά στάδια προσβολής	επαφης
deltamethrin 2,5%	Amcodel, Decis, Ikarus, Lametrin κ.α.	1	7 ημέρες	Καρπόβια 50 ml	–	έναρξη καρπόδεσης, μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφης
deltamethrin 10%	Decis Expert 100 EC	1	7 ημέρες	Καρπόβια 12,5 ml	–	μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφης
	Patriot 100 EC						
deltamethrin 1,5%	Pearl 100 EC						
	Decis Protech 1,5 EW	1	7 ημέρες	Καρπόβια 80 ml	–	έναρξη καρπόδεσης, μεταξύ ωοθεσίας και	επαφης
spinetoram 25%	Delegate 250 WG, Revolux 250 WG	2 / 28 ημ	21 ημέρες	Καρπόβια 5-10 γρ	–	πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών	διελασματικό
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai	Agree 3,8 WP	3/ 7-10 ημ	-	100 γρ σκευ.	NAI	Εφαρμογές κατά της ανθόβιας γενιάς. Όταν δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις σε κάποια περιοχή συνιστώνται : Ψεκασμός όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει.	επαφης, μέσω της κατάποσης των σπορίων του μύκητα
	Xentari 54 WG	4 / 4-14 ημ	-	50 -150 γρ	NAI		
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	Lepinox Plus	3/ 7-10 ημ	-	16,6 γρ	NAI		
	Amcobot WP, Bactoil chemia WP, Bactospeine 54 WG κ.α.	3/ 3-16 ημ.	-	37,5 - 75 γρ	NAI	Έναρξη εφαρμογών όταν 5-25% των ανθέων είναι ανοιχτά.	